

Senkor®

Senkor on valikoiva, systeeminen herbisidi, joka kulkeutuu kasviin juuriston ja lehtien kautta. Se torjuu keskeisimmät rikat ja on tarvittaessa perusaine seoksille. Senkoria voidaan ruiskuttaa perunalla, lajikkeesta riippuen, myös taimettumisen jälkeen. Senkor on ollut viljelijöiden käytössä 30 vuotta – se on tunnettu, testattu ja varma ratkaisu.

Senkor liikkuu kasvin johtosolukossa ylöspäin ja estää yhteyttämisen.

- Senkor on hyvin tehokas, erityisesti pieniin rikkoihin. Torjunta tehoaa jopa ukontattareeseen oikeassa kasvuvaiheessa
- Korkeammilla käyttömäärillä ja hyvissä oloissa Senkor tehoaa myös ohdakkeeseen, valvattiin ja pähkämöön
- Jos rikat ovat ehtineet kookkaammiksi, Basta tai Fenix ovat hyviä seospartnereita. Peruna ei tällöin saa olla taimella

Ratkaisu valtaosaan perunapellon rikkaongelmista

- Senkorilla torjut mm. yleisimmät perunamaiden rikat: savikan, pillikkeen, orvokin, tatarlajit
- Jos lohkolla on mataraa, juolavehneä tai suurikokoista savikkaa, seos Tituk-


sen kanssa on suositeltava. Ruiskutus tehdään tällöin viimeistään perunan taimien ollessa 5-6 cm:n korkuisia

- Mataran tai nurmikan ollessa paha ongelma, on myös seos Fenixin kanssa tehokas


Käytössä huomioitavaa

- Jaettua ruiskutusta suositellaan, jos pellossa esiintyy valvattia ja pähkämöä. Samoin kosteilla ja multavilla mailla jaettu ruiskutus tuottaa parhaan tuloksen
- Jaetussa käsittelyssä ensimmäinen ruiskutus (0,2-0,3 l/ha) tehdään ennen perunan taimettumista ja toinen (0,2-0,3 l/ha) perunan nuorella taimiasteella perunan ollessa 5-6 cm. Valvatin ja pähkämön torjumiseksi toinen käsittely voidaan tehdä myös pelkästään pesäkkeisiin käyttömäärällä

Senkor® vaikuttaa juurten ja lehtien kautta



Esimerkkejä perunan ruiskutusohjelmista



0,5 kg/ha perunan ollessa noin 10 cm korkeaa

- Vesimäärä 150-300 l/ha
- Kiinnitettä lisätään rikkojen taimettumisen jälkeisissä ruiskutuksissa, jos ruiskutussää on kuiva ja/tai torjutaan valvatia, pähkämöä, mataraa, peippiä tai kiertotatarta
- Perunalla esiintyy eri lajikkeiden välillä kestävyseroja

Senkor® porkkanalla

- Porkkanan ruiskutus suoritetaan ennen taimettumista tai porkkanan 2-3 lehtiasteella
- Annostelu on 0,075-0,150 kg/ha vesimäärällä 150-300 l/ha
- Käsittely voidaan suorittaa kertaruiskutuksena tai kahteen kertaan, kokonaiskäyttömäärä ei kuitenkaan saa ylittää 0,150 kg/ha
- Tankkiseoksissa suurin sallittu käyttömäärä on 0,075 g/ha

Senkor® herneellä

- Senkoria voidaan käyttää puolilehdettömillä tai lehdettömillä ruoka-, siemen- ja reuhernelajikkeilla sekä elintarviketeollisuuden sopimusviljelyksillä kestäviksi todetuilla lajikkeilla
- Ei saa käyttää palkoineen korjattavalla herneellä
- Ruiskutus suoritetaan herneen ollessa 5-10 cm:n korkuista käyttömäärällä 0,2-0,4 kg/ha, vesimäärän ollessa 300 l/ha
- Hyväksytyissä tankkiseoksissa, esimerkiksi Fenixin kanssa, käyttömäärä on korkeintaan 0,2 kg/ha

Yleistä Senkorin käytöstä

- Parhaaseen torjuntatulokseen päästään ruiskuttamalla lämpimällä säällä maan ollessa kosteaa. Kuivalla säällä parasruiskutusaika on aamulla ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea
- Jälkikasveina arkoja: viljat, heinät, ristikkaiset

