




KÄYTTÖ


Käsittelyajankohta:

Kasvitautiltartunta on havaittavissa sen eri kehitysasteilla. Usein tauti on jo ehtinyt asettua kasviin, mikä vaatii suurempaa tautiaineen annostusta. Aikaisessa taudin kehitysvaiheessa suoritettava torjunta antaa mahdollisuuden joustavampaan käyttömäärään valintaan ja tehostaa myös torjuntaa. Alempi käyttömäärä lyhentää kuitenkin tautiaineen antamaa suojaa.

- Ehkäisevä:**
Estää tartunnan
- Kuratiivinen (pysäyttävä):**
Estää jo tarttuneen taudin kehittymisen
- Eradikatiivinen (hävittävä):**
Pysäyttää jo näkyviä oireita aiheuttaneen taudin etenemisen
- Itiöiden muodostumista estävä:**
Estää itiötuotannon, sienen vegetatiivinen kasvu ei aina pysähdy



SUOSITUS OHRALLA




- Em. käsittelyajankohdat: rengaslaikku ja verkkolaikku
- Härmä ja ruosteet: esiintyvät usein jo varhaisessa vaiheessa, jolloin on syytä noudattaa aikaisia suositusrajoja
- Tyvilaikku: edellyttää aikaista ruiskutusta
- Punahome: BBCH 61

Ohra:

Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyttyä. Kertaruiskutus voidaan tehdä 2-solmuasteelta aina lippulehden tupen halkeamiseen saakka. Härmää ja ruostetta torjuttaessa suositetaan aikaista ruiskutusta. Jaetussa käsittelyssä ensimmäinen ruiskutus suoritetaan pensomisen lopussa, korren pituuskasvun alkamisesta 2-solmuasteen muodostumiseen. Jälkimmäisen käsittely kannattaa ajoittaa lippulehden esiintulosta lippulehden tupen halkeamiseen.

SUOSITUS VEHNÄLLÄ



- Em. käsittelyajankohdat: laikkutaudit, härmä ja ruoste
- Jos taudinoreita on jo varhain, ruiskutus BBCH 31-32
- Tyvilaikku: viitteellinen käsittelyajankohta BBCH 31-32
- Punahome: BBCH 61

Vehnä: Kertaruiskutus tähkälletulovaiheessa. Jaetussa käsittelyssä ensimmäinen ruiskutus lippulehtivaiheen alussa, toinen ruiskutus tähkälletulovaiheessa.

Käyttömäärä

Syys- ja kevätiljat:

Kertaruiskutuksena 0,2-0,8 l/ha

Jaettuna käsittelynä 2 x 0,2-0,4 l/ha

Käyttö rypsilä

Kasvusto ruiskutetaan tarvittaessa nuppuasteelta alkaen, kuitenkin viimeistään kukinnan loppuvaiheessa (BBCH 53-69). Käytännössä paras torjunta-ajankohta on täyden kukinnan vaihe. Käyttömäärä 0,7 l/ha.

Käytössä huomattavaa:

Käytettävä vesimäärä 150-300 l/ha

Sateenkestävä 1 tunnissa

Varoaika viljoilla 35 vrk ja öljykasveilla 56 vrk

Ei pohjavesirajoitusta eikä perättäisten vuosien käyttörajoituksia.